

CROPVIT B



Tekuté listové hnojivo vo forme kvapalného koncentrátu s obsahom bóru (B).

TYP HNOJIVA:

E.1.1.d Borethanolamin

BALENIE:

5 l, 25 l kanister

ZLOŽENIE:

B 11% (150 g/l ako borethanolamin)

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Používa sa k preventívnemu alebo kuratívne mu odstraňovaniu nedostatku využiteľného bóru v rastlinách. Pri kuratívnej aplikácii formou postreku na list odstraňuje fyziologické anomálie spôsobené nedostatkom tohto prvku v rastline. Preventívne sa aplikuje do porastov na stanovištiach s vysokým deficitom bóru. Preventívne aplikácii možno odporučiť aj u kultúr náročných na dostatočnú zásobu bóru. K takto náročným plodinám

patria: repka, mak, slnečnica, cukrová repa, krmná repa, ovocie, okrasné kvety. Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po olistenie kultúr. Od tejto doby možno hnojivo aplikovať v 14 denných intervaloch. V čase kvitnutia hnojivo priaznivo pôsobí na prerastanie peľu a tým aj na tvorbu semien a plodov. Hnojivo je možné aplikovať po celú dobu vegetácie.

DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE

PLODINA	TERMÍN APLIKÁCIA	DÁVKA (l/ha)
Cukrová a krmná repa	2-4 postreky od fázy 4 listov do zakrytia medziriadkov	1-5
Repka	Formovanie ružice až fáza zeleného puku	1-3
Zemiak	1-2 postreky pred kvitnutím, každých 10-14 dní	1-2
Kukurica	1-2 postreky od fázy 7-8 listu. každých 10-14 dní	1-3
Strukoviny	Pred kvitnutím	1-2
	Po kvitnutí	
Tabak	2-3 postreky pred začatím rastu, každých 10-14 dní	1-2
Jahoda	Začiatok balenia	1-2
	Začiatok kvitnutia	
Zelenina	2 postreky počas intenzívneho rastu	1-2
Iné	0,2-0,5 litra hnojiva na 100 litrov kvapaliny	